

ЎЗБЕКИСТОНДА ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШ КЎРСАТГИЧИНИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ



Ризаев Жасур Алимджанович, Раҳимов Нодир Махамматкулович, Кадиров Хамидулла Хикматович
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ризаев Жасур Алимджанович, Раҳимов Нодир Махамматкулович, Кадиров Хамидулла Хикматович
Самаркандинский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

COMPARATIVE ANALYSES OF THE PROSTATE CANCER INCIDENCE RATE IN UZBEKISTAN

Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhimov Nodir Makhammatkulovich, Kadirov Khamidulla Khikmatovich
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. Простата бези саратони буйича касалланиши Республикамиз буйича охирги 5 йиллик маълумотларни ўйлар кесимида солиштирганимизда (2016-2021й), Ўзбекистон Республикасида 2021 йил охирида 113168 бемор хавфли ўсма касалликлар билан диспансер назоратида турган эди (умумий ахолини 0.3% ташкил этди). Шулардан простата бези саратони 1919 (1.69%) нафар эркакларда учради. Хавли ўсма билан касалланиши кўрсатгичи Республикамиз бўйлаб хар 100.000 ахолига нисбатан 74,0 ташкил килган бўлса, эркаклар орасида касалланиши ошқозон саратони 3.6, ўпка ва бронх хавфли ўсмалари 6.3, простата бези саратони 3.6 кўрсатгичи билан 3 ўринни эгалаб келмоқда. Ўрганилаётган ўйлар кесимида (2016-2021й) хаётида биринчи бор қўйилган бирламчи аниқланган простата бези саратони 10713 эркакда учради. Беморларни ёшга хос тақсимланганда қўйидаги холат кузатилди: 20-24 ёш 22 (1,1%) та, 25-29 ёш 23 (1,2%) та, 30-34 ёш 25 (1,3%) та, 35-39 ёш 32 (1,7%) та, 40-44 ёш 34 (1,8%) та, 45-49 ёш 44 (2,3%) та, 50-54 ёш 75 (3,9%) та, 55-59 ёш 178 (9,3%), 60-64 ёш 320 (16,7%), 65-69 ёш 352 (18,3%), 70-74 ёш 327 (17%), 75-79 ёш 226 (11,8%), 80 ёш ва ундан китта 261 (13,6%). ПБС билан касалланганларни унимодал ўсии нуқтаси 60-74 ёшини ташкил қилган бўлиб у 52% ташкил қилган бўлиб, иккинчи ўсии 80 ёшдан китталарда яна ўсии суръатини кўришимиз мумкин. Республикамиз бўйича ўртача ёш кўрсатгичи 67.6 ± 1.6 лиги аниқланди, 95% ИИ 50-84 ёш. Динамикада бу кўрсатгич тенглаштирилганда ўсии тренди кузатилиб, ўртача ўйлиқ ўсии суръати 0.2% ташкил этди. Ёшга оид таҳлилиниш шуну кўрсатдики энг юқори кўрсатгичлар Республика миқёсида 60-74 ёшда бўлиб, ўртача ёш курсатгичи 67,6 ёшлиги аниқланди. **Хулоса:** Шундай қилиб олинган таҳлилий маълумотларга таяниб простата бези саратонини Республика бўйича қиёсий тарқалишини ўрганиш талабларига мос келади. Шу билан бирга олинган мутлоқ сон ва рақамлар касалликни тарқалиши хусусиятларини тўлиқ очиб беролмайди, бу учун интенсив стандартлаштирилган бошқа статистик формулалар орқали хисоблаш талаб этилади ва чуқур таҳлилларни тақозо этади. Ўрганиши олиб бораётган ёшга оид гурухлар натижаларида кескин сакрашлар кузатилмаганилиги учун Республика буйича касалланиши даражасида динамик ўзгаришилар кузатилмади, шунинг учун касалликни стандартлашган кўрсатгичлари республика буйича ўртача қийматларда сақланиб қолди.

Калим сўзлар: простата бези саратони, касалланиши кўрсатгичи, ўртача ёш.

Abstract. If we compare the last 5-year data on incidence of prostate cancer in our Republic (2016-2021), at the end of 2021 there were 113168 patients with malignant tumor diseases (0,3% of all population) on the medical registration in the Republic of Uzbekistan. Of these, 1,919 (1.69%) men were found to have prostate cancer. While the incidence of malignant neoplasms in our Republic is 74.0 per 100,000 population, the incidence among men ranks 3rd with stomach cancer at 3.6, lung and bronchial malignant tumors at 6.3, and prostate cancer at 3.6. By study year (2016-2021), 10713 men were diagnosed with primary prostate cancer for the first time in their lives. In the distribution of patients by age, the following situation was observed: 20-24 years 22 (1.1%), 25-29 years 23 (1.2%), 30-34 years 25 (1.3%), 35-39 years 32 (1.7%), 40-44 years 34 (1.8%), 45-49 years 44 (2.3%), 50-54 years 75 (3, 9%), 55-59 years 178 (9.3%), 60-64 years 320 (16.7%) %, 65-69 years 352 (18.3%), 70-74 years 327 (17%), 75-79 years 226 (11.8%), 80 years and older 261 (13.6%). The unimodal growth point for patients with PCP was in the 60-74 years, which was 52%, and we can observe a second-

growth rate in people over 80 years of age. The median age for our Republic was determined to be 67.6 ± 1.6 years, 95% CI 50-84 years. When comparing this index in the dynamics there was a tendency of growth, the average annual growth rate was 0.2%. Our age analysis showed that the highest rates in the republic were in the age 60-74 years, and the average age rate was 67.6 years. Conclusion: On the basis of the analytical data obtained in this way it corresponds to the requirements of the study of the comparative spread of prostate cancer in the Republic. At the same time the absolute numbers and figures obtained cannot fully reveal the peculiarities of the disease spread, which requires calculation with the help of other statistical formulas, intensively standardized, and requires in-depth analysis. Due to the absence of sharp jumps in the results for the age groups under study there were no dynamic changes in the level of morbidity in the Republic, so the standardized morbidity rates remained at the level of the average values in the Republic.


Key words: prostate cancer, incidence rate, average age.

Простата бези саратони буйича касалланиш Республикализ бўйича охирги 5 йиллик маълумотларни йиллар кесимида солиштирганимизда (2016-2021й), Ўзбекистон Республикасида 2021 йил охирида 113168 бемор хавфли ўсма касалліклар билан диспансер назоратида турган эди (умумий ахолини 0.3% ташкил этди) [2.3]. Шулардан простата бези саратони 1919 (1.69%) нафар эркакларда учради. Хавли ўсма билан касалланиш кўрсатгичи Республикализ бўйлаб хар 100.000 ахолига нисбатан 74,0 ташкил килган бўлса, эркаклар орасида касалланиш ошқозон саратони 3,6, ўпка ва бронх хавфли ўсмалари 6,3, простата бези саратони 3,6 кўрсатгичи билан 3 ўринни эгалаб келмоқда.

Максад: Ўзбекистон Республикасида вилоятлар кесимида простата бези саратонини

касалланиш кўрсатгичини ўрганиш қиёсий тахлилини утказиши.

Тадқиқотнинг обьекти сифатида 2016 йилдан 2020 йилгача, Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий, тиббиёт марказида, шунингдек РИО ва РИАТМ Самарқанд вилояти филиали бўлимларида стационар ва амбулатор даволанган простата бези саратони бўлган 1901 нафар bemорлар киритилди. Тадқиқот иши Самарқанд давлат тиббиёт институтининг онкология кафедрасида олиб борилди ва Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказида, шунингдек РИО ва РИАТМ Самарқанд филиалида стационар ва амбулатор даволанган простата бези саратони бўлган 1901 нафар bemорларнинг даволаш натижаларига асосланди.



Расм 1. Ўрганилаетган йилларда ПБС ёшга оид тақсимланиши

Жадвал 1. ПБС билан касалланган bemорларни ўртача ёши буйича тақсимланиши

Номи	$2^{\circ}9$	$2^{\circ}1^{\circ}$	$2^{\circ}11$	$2^{\circ}12$	$2^{\circ}13$	$2^{\circ}14$	$2^{\circ}15$	$2^{\circ}16$
Ўртача ёши	51,3	5°,7	51°	51,5	49,8	51,6	51,4	52,1
Ўрта хатолик	°,5	°,5	°,5	°,4	°,4	°,4	°,4	°,4
тренд	5°,8	5°,9	51°	51,1	51,2	51,3	51,5	51,6

Жадвал 2. ПБС беморларда ёшга нисбатан ўртача йиллик кўрсатгичи

Ёш	M	m	95% ИИ
25-34 ёш	0.003 ↓	0.002	0.00-0.01
35-44 ёш	5.0	0.1	4.8-5.3
45-64 ёш	9.0	0.1	8.8-9.2
65-79 ёш	31.9 ↑	0.4	31.1-33.7
80 ёшдан каттаси	23.5	1.0	21.9-25.5

Натижা: Ўрганилаетган йиллар кесимида (2017-2021й) хаётида биринчи бор қўйилган бирламчи аниқланган простата бези саратони 10713 эркада учради. Беморларни ёшга хос тақсимланганда қўйидаги холат кузатилди: 20-24 ёш 22 (1,1%) та, 25-29 ёш 23 (1,2%) та, 30-34 ёш 25 (1,3%) та, 35-39 ёш 32 (1,7%) та, 40-44 ёш 34 (1,8%) та, 45-49 ёш 44 (2,3%) та, 50-54 ёш 75 (3,9%) та, 55-59 ёш 178 (9,3%), 60-64 ёш 320 (16,7%), 65-69 ёш 352 (18,3%), 70-74 ёш 327 (17%), 75-79 ёш 226 (11,8%), 80 ёш ва ундан катта 261 (13,6%).

1-расмга мувофиқ ПБС билан касалланганларни унимодал ўсиш нуктаси 60-74 ёшни ташкил қилган бўлиб у 52% ташкил қилган бўлиб, иккинчи ўсиш 80 ёшдан катталарда яна ўсиш суръатини кўришимиз мумкин.

Республикамиз бўйича ўртача ёш кўрсатгичи 67.6 ± 1.6 лиги аниқланди, 95% ИИ 50-84 ёш. Динамикада бу кўрсатгич тенглаштирилганда ўсиш тренди кузатилиб, ўртача йиллик ўсиш суръати 0.2% ташкил этди.

Ёшга оид тахлилимиз шуни кўрсатдиги энг юқори кўрсатгичлар Республика миқёсида 60-74 ёшда бўлиб, ўртача ёш курсатгичи 67,6 ёшлиги аниқланди (жадвал 1).

Шундай қилиб олинган тахлилий маълумотларга таяниб простата бези саратонини Республика бўйича қиёсий тарқалишини ўрганиш талабларига мос келади. Шу билан бирга олинган мутлоқ сон ва ракамлар касалликни тарқалиш хусусиятларини тўлиқ очиб беролмайди, бу учун интенсив стандартлаштирилган бошқа статистик формулалар орқали хисоблаш талаб этилади ва чуқур тахлилларни тақозо этади.

Эркаклар учун хисобланган ўртача йиллик қўполкасалланиш даражаси $9.0 \pm 0.1 /_{000}$ (95% ИИ=8,8-9,2%/₀₀₀) иборат бўлди. Простата бези саратонини қўполкасалланиш даражаси ўртача йиллик даражасида сақланиб туриб $9.2 /_{000}$ атрофига бўлди. Бу кўрсатгич тенглаштирилганда ўртача йиллик пасайиш даражаси $T_{\text{пас}} = m - 0.13\%$ ташкил этди.

Жумладан 2017 йилда стандартлашган касалланиш кўрсатгичи $11.6 /_{000}$ кузатилган бўлса, қўполлашган кўрсатгич $9.2 /_{000}$ иборат бўлди. 2018, 2019, 2020 йилларда стандартлашган ва кўпол кўрсатгичларни хам пасайши кузатилди. Шуни алоҳида таъкидлаш керакка 2019 йилгача стандартлашган кўрсатгич қўпорл кўрсатгичга

нисбатан стабил эди. 2019 йилдан бошлаю бу икки кўрсатгичларни ошиши кузатилди. Ба 2020 йилга келиб қўполлашган кўрсатгич $9.2 /_{000}$, стандартлашган кўрсатгич $1^{0.3 /_{000}}$ гача ўзгарди.

5 йиллик динамик кузатув натижаси шуни кўрсатдиги касалланиши стандартлашган кўрсатгичи Ўзбекистон буйлаб қўйдагича фарқланди: дунё стандарти (ДС) бўйича $10.3 /_{000}$ (95% ИИ=10.3-1.8/₀₀₀) эга бўлиб, бу кўрсатгичлар тенглаштирилганда стандарт кўрсатгичлар стабил бўлиб ДСни ўртача йиллик рақамларига тенглашганлигини кўришимиз мумкин, шунингдек қисман пасайиш суръатини кўришимиз мумкин. Пасайиш суръати $T_{\text{пк}} = -1.7\%$ ташкил этди.

ЎзР ПБС ёшга хос хусусияти хавфли ўсмаларни ўзига хос хусусиятларидан бири бу турли ёшда ўсма турлича кечади ва заарлайди, ва шу критериялардан бири бу ёшга хос хусусиятларидир. Бизни тадқиқотларимиздан бири бу ПБС ёшлар кесимида учраш частотасини ўрганишдан иборат эди.

2-жадвалдан кўриниб туриптики ПБС ёшларда яъни 25-34 ёшда энг кам касалланиш кўрсатгичига эга $0.003 \pm 0.002 /_{000}$ (95% ИИ 0.00-0.01), яъни бу билан бу ёшда айрим холатда каузистик холда учраши аниқланди. Бу кўрсатгич $35-44$ ёшда $5.0 \pm 0.1 /_{000}$ (95% ИИ 4.8-5.3) учради; $45-64$ ёшда касалланиш кўрсатгичи $9.0 \pm 0.1 /_{000}$ (95% ИИ 8.8-9.2) холат кузатилди. Энг юқори касалланиш кўрсатгичи $65-79$ ёшда кузатилди $31.9 \pm 0.4 /_{000}$ (95% ИИ 31.1-33.7), иккинчи ўринда 80 ёшдан катталарда аниқланди $23.5 \pm 1.0 /_{000}$ (95% ИИ 21.9-25.5).

Олинган маълумотларни тахлил қилас эканмиз ёшга хос касалланиш кўрсатгичи $65-79$ ёшда булиб, энг ками 25-34 ёшдалиги топилди.

ПБС касалланиш тренди. ПБС билан касалланган турли ёш гурухларини ўрганиш давомида умумий тенденцияларни баҳолаш ва тавсифлаш имконини берди, яъни нисбатан касалланиш кўрсатгичи стабиллиги аниқланди, аммо ёшга нисбатан тахлиллар айрим ёшларда уни кўтирилганини кўрсатмоқда. Касалланиш кўрсатгичини ўзариши маълум ёшда кўтарилиши, маълум ёшда пасайиши билан изохланади. Простата бези саратони тренди $65-79$ ёшда бироз пасайиш тенденциясига эга бўлди, ўртача йиллик камайиш кўрсатгичи тенглаштирилгандан сўнг $T_{\text{паст}} = -0.3\%$ хосил

қилди. Бошқа ёшга доир кўрсатгичларда касалланиш кўрсатгиchi унчалик катта фарқа эга бўлмади 45-64 ёш оралигига $T_{\text{паст}} = -3,6\%$, 35-44 ёшда $T_{\text{паст}} = -4,07\%$

Хуноса. ПБС ёшга хос хусусиятини тахлил этиш вақтида аниқланган камчиликлардан бири бу Диспансерлар томонидан топшириладиган ССВ- 7 шаклдаги йиллик хисоботларда 1-бўлимида (янги ташхис билан хисобга олинган беморлар сони, локализацияси, жинси ва ёшга мос таксимланиши) ва 3- кисми (хавфли усмалардан ўлиш сони)да ўзагтириш киритиш орқали ПБС эпидимиологиясини тўлиқ ўрганиш ва касалликни ривожланиш сабаблари ва тенденцияларини ўрганиш имкониятларини кенгайтиради. Бизни таклифимиз Ушбу хисобот шаклдаги ёш тақмимотини 5 йиллик интервал билан бериш мақсадга мувофиқ, чунки статистик-эпидимиологик тахлилларни аниқ хисоблаш имкониятини беради.

Ўрганиш олиб бораётган ёшга оид гурухлар натижаларида кескин сакрашлар кузатилмаганлиги учун Республика буйича касалланиш даражасида динамик ўзгаришлар кузатилмади, шунинг учун касалликни стандартлашган кўрсатгичлари республика буйича ўртacha қийматларда сақланиб қолди.

Адабиётлар:

1. Ризаев Ж. А., Хазратов А. И. Канцерогенное влияние 1, 2-диметилгидразина на организм в целом //Биология. – 2020. – Т. 1. – С. 116.
2. Alimjanovich, R. Z., Maxammatkulovich, R. N., & Khikmatovich, K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157.
3. Tillyashayxov M.N., Ibragimov SH.N., Djanklich S.M. Sostoyanie onkologicheskoy pomoshi naseleniyu Respublikи Uzbekistan v 2019 godu// Tashkent-2020, s. 1-120

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ризаев Ж.А., Рахимов Н.М, Кадиров Х.Х.

Резюме. Если сравнить последние 5-летние данные о заболеваемости раком предстательной железы по нашей Республике (2016-2021 гг.), то на конец 2021 года в Республике Узбекистан на диспансерном учете находились 113168 больных со злокачественными опухолевыми заболеваниями (0,3% всего населения). Из них рак предстательной железы обнаружен у 1919 (1,69%) мужчин. В то время как показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями по нашей Республике составляет 74,0 на 100.000 населения, заболеваемость среди мужчин занимает 3 место с показателями рака желудка - 3,6, злокачественных опухолей легких и бронхов - 6,3, рака предстательной железы - 3,6. В разрезе годов исследования (2016-2021 гг.) у 10713 мужчин впервые в жизни был диагностирован первичный рак предстательной железы. При распределении больных по возрасту наблюдалась следующая ситуация: 20-24 года 22 (1,1%), 25-29 лет 23 (1,2%), 30-34 года 25 (1,3%), 35-39 лет 32 (1,7%), 40-44 года 34 (1,8%), 45-49 лет 44 (2,3%), 50-54 года 75 (3,9%), 55-59 лет 178 (9,3%), 60-64 года 320 (16,7%), 65-69 лет 352 (18,3%), 70-74 лет 327 (17%), 75-79 лет 226 (11,8%), 80 лет и старше 261 (13,6%). Унимодальная точка роста для пациентов с РПЖ пришлась на 60-74 года, что составило 52%, и мы можем наблюдать темп роста второго прироста у людей старше 80 лет. Средний возрастной показатель по нашей Республике определен в $67,6 \pm 1,6$ года, 95% ИИ 50-84 года. При сравнении данного показателя в динамике наблюдалась тенденция роста, среднегодовой темп роста составил 0,2%. Проведенный нами возрастной анализ показал, что самые высокие показатели по республике были в возрасте 60-74 года, а средний возрастной показатель составил 67,6 лет. Заключение: На основании полученных таким образом аналитических данных это соответствует требованиям изучения сравнительного распространения рака предстательной железы по Республике. В то же время полученные абсолютные числа и цифры не могут полностью раскрыть особенности распространения заболевания, что требует расчета с помощью других статистических формул, интенсивно стандартизованных, и требует глубокого анализа. В связи с отсутствием резких скачков результатов по исследуемым возрастным группам динамических изменений уровня заболеваемости по Республике не наблюдалось, поэтому стандартизованные показатели заболеваемости остались на уровне средних значений по республике.

Ключевые слова: рак предстательной железы, показатель заболеваемости, средний возраст.