

ПАРАНОИД ШИЗОФРЕНИЯ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ДИГЕСТИВ БУЗИЛИШНИНГ АРТ-ТЕРАПИЯСИ



Бабарахимова Сайёра Бориевна, Мирворисова Замира Шухратовна, Файзуллаева Камилла Радиковна
Тошкент педиатрия тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.

АРТ-ТЕРАПИЯ ДИГЕСТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Бабарахимова Сайёра Бориевна, Мирворисова Замира Шухратовна, Файзуллаева Камилла Радиковна
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент

ART THERAPY OF DIGESTIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA

Babarakhimova Sayyora Borievna, Mirvorisova Zamira Shukhratovna, Fayzullaeva Kamilla Radikovna
Tashkent Pediatric Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Tashkent

e-mail: sayorababaraximova2010@gmail.com

Резюме. Мақсад: параноид шизофрениянинг клиник кўринишида юзага келадиган дигестив бузилиши бўлган беморларда ушбу гуруҳ беморларига тиббий ва психолого-психономикалык ёрдам кўрсатишни яхшилаш учун арт терапия самародорлигини ўрганиши. Материал ва Методлар: Таъдикотдан психиатрия шифохонасидағи параноид шизофренияли 37 нафар бемор шитирок этди. Улардан 19 нафари аёл, 18 нафари эса дигестив бузилиши эркаклар бўлиб, таъдикот давомида клиник, психопатологик таъдикот усуllibаридан фойдаланилган. Психометрик усуllibардан Калгари шкаласи, PANSS шкаласи, EAT-40 қўлланилди: озиқ-овқат истеъмолига муносабат тести (анорексия ва булимия диагностикаси), шунингдек, беморнинг тарихини ретроспектив таҳлил қилиши. Барча беморларга рацонал психотерапия ва мусиқа терапияси билан биргаликда арт-терапиянинг гуруҳ машгулотлари шаклида психотерапия ишлари ўтказилди. Натижалар: Арт-терапиянинг гуруҳ машгулотларидан сўнг, депрессив патологиянинг оғирлиги сезиларли даражасада пасайган ва дигестив бузилиши камайган. Хулоса: Ушбу таъдикотлар параноид шизофренияли беморларда бузилишларини даволашга комплекс ёндашувни оптималлаштириши, касалхонага ётқизиш сонини камайтириши, ремиссия даврларини узайтириши ва юзага келиши мумкин бўлган соматик асосатларни олдини олиши имконини беради.

Калим сўзлар: арт-терапия, параноид шизофрения, дигестив бузилишлар, гендер фарқлар.

Abstract. Objective: to study the effectiveness of art therapy in patients with digestive disorders occurring in the clinical picture of paranoid schizophrenia to improve medical and psychological care for this group of patients. Material and methods: The study included 37 patients with paranoid schizophrenia who were hospitalized in a psychiatric hospital. Among them, there were 19 female patients and 18 men with eating disorders. During the study, clinical, psychopathological and follow-up methods of research were used. Of the psychometric methods, the Calgary Scale, PANSS Scale, EAT-40 were used: a test of attitude to food intake (diagnosis of anorexia and bulimia) as well as a retrospective analysis of patient histories. All patients underwent psycho-corrective work in the form of group sessions of art therapy in combination with rational psychotherapy and music therapy. Conclusion: thus, the results obtained during the study contribute to the improvement of the planning of the provision of pharmacotherapy in combination with psychotherapy. The used integrative methods of psychotherapy for patients with paranoid schizophrenia, taking into account gender characteristics in psychiatric hospitals, will help optimize the rehabilitation of patients with restrictive eating behavior, reduce the number of hospitalizations and maximize the remission period.

Keywords: art therapy, paranoid schizophrenia, eating disorders, gender differences.

Кириш: Параноид шизофренияли беморларда дигестив бузилишларини ўрганиши муаммосининг долзарблиги амалий соғлиқни саклашнинг энг муҳим вазифаларидан биридир [1,3,7]. Адабиётда шизофренияли беморларда овқат ҳазм қилиш бузилиши бўйича жуда кам

илмий ишлар мавжуд бўлиб, улар асосан гендер фарқлари ва синдромологик жиҳатдан клиник фарқларнинг ўзига хос хусусиятига эътибор бермасдан, ушбу ҳодисанинг клиник кўринишини ўрганадилар [2,6].



Расм 1. Эркак беморларнинг ижоди

Дигестив бузилиш билан бирга келадиган параноид шизофренияли беморларда психотерапевтик аралашувнинг самарадорлиги бугунги кунгача амалий психиатрияда мунозарали масала бўлиб қолмоқда[4,5].

Тадқиқот мақсади: параноид шизофрениянинг клиник кўринишида юзага келадиган дигестив бузилиши бўлган беморларда ушбу гурӯҳ беморларига тиббий ва психологик ёрдам кўрсатишни яхшилаш учун арт терапия самарадорлигини ўрганиш.

Материал ва методлар: Тадқиқотда психиатрия шифохонасидаги параноид шизофренияли 37 нафар бемор иштирок этди.

Улардан 19 нафари аёл, 18 нафари эса дигестив бузилишли эркаклар бўлиб, тадқиқот давомида клиник, психопатологик тадқиқот усулларидан фойдаланилган.

Психометрик усуллардан Калгари шкаласи, PANSS шкаласи, EAT-40 қўлланилди: озиқ-овқат истеъмолига муносабат тести (анорексия ва булимия диагностикаси), шунингдек, беморнинг тарихини ретроспектив таҳлил қилиш. Барча беморларга рационал психотерапия ва мусиқа терапияси билан биргаликда арт-терапиянинг гурӯҳ машғулотлари шаклида психотерапия ишлари ўтказилди.

Иzlаниш натижалари: Аёлларда дигестив бузилишининг гендер хусусиятлари асосан хаддан ташқари овқатланиш, метаболик синдромнинг шаклланиши билан ифодаланган.

Эркакларда дигестив бузилиш кўпинча овқатдан бош тортиш, вазн йўқотишга ёрдам берадиган парҳез кўшимчаларидан фойдаланиш билан намоён бўлди, бу эса мослашишнинг пасайишига ва эндоген жараённинг қайталанишига олиб келди.

Психотерапевтик аралашувнинг асосий усули "Озиқ-овқат" стрессга қарши ранг берувчи трафаретлардан фойдаланган ҳолда арт терапия эди. Арт-терапиядан олдин барча текширилган беморларда депрессия белгиларининг оғирлик даражаси мавжуд эди. Арт-терапия машғулотлари Тошкент шахридаги шаҳар руҳий каксалликлар клиник шифохонасининг ёпиқ бўлимларида клиник ва тиббий психологлар томонидан ҳафтасига уч марта, беморларни уч ойлик кузатув давомида 45-60 дақика давом этган ҳолда ўтказилди. Эркак беморларнинг кўпчилиги психотерапевтнинг вазифаларини бажаришдан мамнун бўлишди, асосан арт терапия вақтида ёрқин исисқ ранглардан фойдаланганлар (1-расм).

Эркак беморлар кўп ҳолларда гўшт маҳсулотлари, тез тайёрланадиган таомларнинг трафаретларини бўяшни афзал кўришди.

Эркакларда акварел ва гуаш бўёқ палитрасининг табиий рангларидан фойдаланиш кузатилди. Аёл беморлардан фарқли ўлароқ, эркаклар арт-терапия машғулотларида камдан-кам ҳолларда мозаика, апликация ва нақшли трафаретларни бисер билан безашган. Аёллар қандолатчилик маҳсулотларини акс эттирувчи шаблонларни бўяшдан хурсанд бўлишди - торт, хамир овқатлар, ширинликлар, пицца, нон маҳсулотлари (2-расм).

Эркаклардан фарқли ўлароқ, аёллар озиқ-овқатли расмларни бўяш учун ранглар палитрасининг совук рангларини танладилар, бу уларнинг танловини овқатдан нафратланиш ва иштаҳанинг этишмаслиги билан тушунтирилади. Беморлар кўп ҳолларда бўяш трафаретларини аквареллар билан мозаик дизайн, апликация, гуруч, гречка ва ловия доналарини чизмаларга ёпишириш билан бирлаштирилар (3-расм).



Расм 2. Аёл bemорларнинг ижоди



Расм 3. Арт-терапия усулларидан биргаликда фойдаланиш

Аёллар томонидан арт-терапия усулларидан биргаликда фойдаланиш психо-корректив аралашувнинг тинчлантирувчи компонентининг янада самарали таъсири билан изохланди. Арт-терапиянинг гурух машғулотларидан сўнг, депрессив патологиянинг оғирлиги сезиларли

даражада пасайган ва дигестив бузилиши камайган.

Хулосалар: Ушбу тадқиқотлар параноид шизофренияли bemорларда бузилишларини даволашга комплекс ёндашувни оптималлаштириш, касалхонага ётқизиш сонини

камайтириш, ремиссия даврларини узайтириш ва юзага келиши мумкин бўлган соматик асоратларни олдини олиш имконини беради.

Адабиётлар:

1. Антохин Е.Ю. Гендерные аспекты психогенных депрессий: особенности клиники, подходы к терапии // Социальная и клиническая психиатрия. 2010. - №2. - С.52-60
2. Бабарахимова С.Б., Шаханская О.В., Искандарова Ж.М. Личностные особенности женщин с депрессивными расстройствами и их влияние на качество жизни // Сборники конференций НИЦ Социосфера 2013. – №21. – С.109-112.
3. Бабарахимова С.Б., Мирворисова З.Ш., Файзуллаева К.Р. Особенности психокоррекции расстройств пищевого поведения у больных параноидной шизофренией с учётом гендерных особенностей // Материалы международной научно-практической конференции «Интеграция науки и практики в медицине: достижения и перспективы», Кемерово, 2022. - С.236-242.
4. Демидова, Т. Ожирение проблема всех возрастов и всех стран / Т. Демидова // Диабет. Образ жизни. - 2000. - № 2. - С. 38-41.
5. Ромацкий, В. В. Феноменология и классификация нарушений пищевого поведения: аналитический обзор литературы, часть II / В. В. Ромацкий, И. Р. Семин // Бюллетень сибирской медицины. 2006. - №4. - С. 83.
6. Neumarker, K. Perspectives of eating disorders from the Charite Hospital in Berlin / K. Neumarker, A. Bartsch // Eur. Child Adolesc. Psychiatry. 2003. - V. 12.-P. 14-19.
7. Matveeva A.A., Sultonova K.B., Abbasova D.S. et al. Optimization of psycho-diagnostics of emotional states // Danish Scientific Journal. 2020. VOL 3, No 5 pp. 24-27

АРТ-ТЕРАПИЯ ДИГЕСТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Бабарахимова С. Б., Мирворисова З. Ш.,
Файзуллаева К.Р.

Резюме. Цель: изучить эффективность применения арт-терапии у пациентов с дигестивными нарушениями, встречающимися в клинической картине параноидной шизофрении для улучшения медико-психологической помощи данному контингенту больных. Материал и методы: в исследование были включены 37 пациентов с параноидной шизофренией, находившихся на стационарном лечении в психиатрической больнице. Среди них лиц женского пола было 19 пациенток и 18 мужчин с расстройствами пищевого поведения. В ходе исследования использованы клинико-психопатологический и катамнестический методы исследования. Из психометрических методов использованы Шкала Calgary, Шкала PANSS, EAT-40: тест отношения к приему пищи (диагностика анорексии и булимии) а также ретроспективный анализ историй болезней пациентов. Всем пациентам проводилась психокоррекционная работа в виде групповых сеансов арт-терапии в комбинации с рациональной психотерапией и музыкотерапией. Результаты: После групповых сеансов арт-терапии отмечалось значительное снижение тяжести депрессивной патологии и редукция расстройств пищевого поведения. Вывод: полученные в ходе исследования результаты способствуют улучшению планирования оказания фармакотерапии в комбинации с психотерапией. Использованные интегративные методы психотерапии для пациентов с параноидной шизофренией с учётом гендерных особенностей в условиях психиатрических больниц помогут оптимизировать реабилитацию пациентов с ограничительным пищевым поведением, сократить количество госпитализаций и максимально продлить период ремиссии.

Ключевые слова: арт-терапия, параноидная шизофрения, расстройства пищевого поведения, гендерные различия.