

COVID-19 ПАНДЕМИЯСИННИГ СПИРТЛИ ИЧИМЛИКЛАРНИ ИСТЕЙМОЛ ҚИЛИШ ЧАСТОТАСИ ВА МИҚДОРИГА ТАЪСИРИ



Тураев Бобир Темирпулатович, Очилов Улугбек Усмонович, Абдуразакова Робия Шералиевна,
Тураев Толиб Махмуджонович
Самарқанд Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЧАСТОТУ И КОЛИЧЕСТВО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

Тураев Бобир Темирпулатович, Очилов Улугбек Усмонович, Абдуразакова Робия Шералиевна,
Тураев Толиб Махмуджонович
Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FREQUENCY AND AMOUNT OF ALCOHOL CONSUMPTION

Turaev Bobir Temirpulatovich, Ochilov Ulugbek Usmonovich, Abdurazakova Robiya Sheralevna,
Turaev Tolib Mahmudjonovich
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: bobir.turaev.89@mail.ru

Резюме. COVID-19 пандемияси хавотир, депрессия, уйқу бузилиши, спиртли ичимликларни истеъмол қилиши ва руҳий саломатликга таъсир ҳакида датлабги маълумотлар мавжуд. Пандемия шароитида спиртли ичимликларни истеъмол қилиши боғлиқ бўлган гайриоддий шароитлар туфайли юзага келган қийинчилкларни енгизи учун ишлатилиши мумкин. Спиртли ичимликларни истеъмол қилиши ва кайфият ёки хавотир ўртасидаги коморбидлик ўз-ўзини даволаш билан изоҳланади. Тадқиқот мақсади: спиртли ичимликларни истеъмол қилишига COVID-19 пандемиясининг таъсирини ўрганиши. Тадқиқот текшириши усули: Спиртли ичимликларни истеъмол қилиши частотаси ва миқдори бузилишини аниқлаш сўровномаси (*Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT*) орқали баҳоланди. Хулоса: Алкоголизм билан касалланган беморларда спиртли ичимликларни истеъмол қилиши миқдорининг ортишига асосий сабаб оиласда ёши болаларнинг мавжудлиги, уйда қолишига маъжбурлилик ва уйда ишлаш, даромат манбаини түйғотиши.

Калим сўзлар: COVID-19 пандемияси, хавотир, депрессия, алкоголизм.

Abstract. There are preliminary data on the effects of the COVID-19 pandemic on anxiety, depression, sleep disorders, alcohol consumption, and mental health. In a pandemic, alcohol consumption can be used to overcome the difficulties caused by the associated abnormal conditions. The comorbidity between alcohol consumption and mood or anxiety is explained by self-medication. The aim of the study: to study the impact of the COVID-19 pandemic on alcohol consumption. Research Method: The frequency and amount of alcohol consumption was assessed using the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Conclusion: The main reason for the increase in alcohol consumption in patients with alcoholism is the presence of young children in the family, the need to stay at home and work at home, the loss of income.

Key words: COVID-19 pandemic, anxiety, depression, alcoholism.

Долзарблиги. COVID-19 пандемияси пайтида уйда қолиш ахоли орасида руҳий саломатлик ва психоактив моддаларни истеъмол қилиши хатти-харакатларига таъсир кўрсатиши мумкин. COVID-19 пандемиясининг спиртли ичимликларни истеъмол қилишни чеклаш бўйича олиб борилган дастлабки тадқиқотлар шуни кўрсатадики, пандемия даврида спиртли ичимликлар суистемолида ўзгаришлар юз берган, аммо бу ис-

теъмолнинг умумий ўсишига олиб келмаган [2, 4]. Хавотир, депрессия, уйқу бузилиши, спиртли ичимликларни истеъмол қилиши ва руҳий фаровонлик одатдагидан пастроқ бўлганлиги таъкидланган [1, 5, 9]. Физиологик стресстдаги ўзгаришлар туфайли спиртли ичимликларни истеъмол килиш хавфи ошади [3, 7].

Пандемия билан боғлиқ кенг кўламли шароитлар ёки руҳий саломатлик заифликлари

спиртли ичимликларни истеъмол қилишдаги ўзгаришларга таъсир қилиши мумкин, айниқса психоактив моддалар пандемия билан боғлиқ бўлган гайриоддий шароитлар туфайли юзага келган қийинчиликларни енгиш учун ишлатилиши мумкин. Ҳақиқатан ҳам, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ва кайфият ёки хавотир ўртасидаги коморбидлик тез-тез ўз-ўзини даволаш билан изоҳланади [6, 8]. Пандемия шароитида аҳоли яшаш шароитлари ва психологик шароитларга қараб турлича таъсир кўрсатиши мумкин.

COVID-19 пандемияси боғлиқ стресс омиларини, депрессия, хавотир, психоактив моддаларни истеъмол қилишни назорат қилиш муҳимлигини кўрсатди


Тадқиқот максади. Спиртли ичимликларни истеъмол қилишга COVID-19 пандемиясининг таъсирини ўрганиш

Тадқиқот текшириш усуслари. Тадқиқот Самарқанд вилоят наркология диспансери ва Самарқанд шаҳар кўп тармоқли поликлиникинси базасида 120 нафар иштирокчига сўровнома асосида 2020-2021 йиллар давомида COVID-19 пандемияси давридан сўнг анамнезтик малумотларга асосан ўтказилди. Текшириувчилар икки гурухга бўлиниб ўрганилди. Асосий гурухга Самарқанд вилоят наркология диспансери (КХТ-10) F10.2 алкоголизм 2-босқич ташхиси билан даволанган ва даволаниб келаётган 70 нараф беморлар танлаб олинди. Назорат гурухига анамнезидан байрамларда ва туй маросимларида алкоголли маҳсулотлар истеъмол қилувчи (эпизотик) 50 нафар шахслар танлаб олинди.

Иштирокчиларнинг ёши 24 ёшдан 52 ёшгача бўлган ўртача ёши $33,67 \pm 5,35$ ёш. Тадқиқот усусларидан ижтимоий-демографик (оиласи ҳақиқати), карантин пайтида касбий вазият (уйда ишлаш, одатий иш жойи ва ишсиз) ва молиявий даромадни йўқотиш. Спиртли ичимликларни истеъмол қилиш частотаси ва миқдори бузилишини аниқлаш сўровномаси (Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT) оркали баҳоланди.

Тадқиқот натижалари. Карантин пайтида касбий вазият (уйда ишлаш ва ишсизлик) текширилганда гурухларда қўйдаги кўрсатгичлар намоён бўлди. Асосий гурухда 20% текшириувчилар уйда ишлашга мажбур бўлишди. 20% одатий иш тартиби ўзгаришсиз қолди (булар дехқончилик ва чорвачилик билан шуғунланувчилар). 60% беморлар ишдан ёки даромат манбаидан ажралганини билдиришди. Назорат гурухидагилар текширилганда қўйдаги ўзгаришлар аниқланди. 40% уйда ишлашга мажбур, 30% одатий иш тартиби, 30% ишдан ёки даромат манбаидан ажралган. Асосий гурух текшириувчиларининг 10% ҳаёти давомида оила курмаган, 20% оиласи билан ажрашган ёки бирга яшамайди, 70% оиласи. Назорат гурухда 10% оила курмаган, 5% ажрашишган, 85% оиласи.

Асосий гурухда 30% да ичиш миқдори ўзгармаган лекин частотаси ўзгарган, 60% да миқдор ва частота параллел равишда ортган, 10% камайган (сабаб уларда молиявий қийинчилик). Ичиш частотасига кўра асосий гурухда 30% ҳафтада камида 2-4 марта, 40% да деярли ҳар кун, 30% ҳар кун.



Расм 1. COVID-19 пандемиясининг спиртли ичимликларни истеъмол қилишнинг миқдор ва частотасига таъсири

Фойдаланиш усули ўрганилганда 10% ўз шериги билан, 60% ёлғиз ва 30% очық ҳавода дўстлари билан (карантин қоидаларини бузиб) спиртли ичимликлар истеъмол қилган (расм 1). Назорат гурухида 50% ичиш микдори ўзгармаган лекин частотаси ўзгарган, 30% ортган, 20% камайган. Ичиш частотасига кўра 32% ҳеч қачон спиртли ичимликларни истеъмол қилмаган, 30% ҳафтасига бир марта, 32% 2-4 марта ҳафтасига, 6% деярли ҳар куни ва ҳар куни спиртли ичимликларни истеъмол қилувчилар аниқланмади. Фойдаланиш усули ўрганилганда 20% ўз шериги билан, 30% дўстлари билан онлайн, 40% ёлғиз ва 10% очық ҳавода дўстлари билан спиртли ичимликлар истеъмол қилган.

Асосий гурухда карантин пайтида спиртли ичимликларни истеъмол қилиш кўпайган деб ҳисоблаганлардан, 50% спиртли ичимликларни дам олиш учун, 40% аввалгидан кўра кўпроқ вақтлари бўлгани учун, 10% эса дўстлари билан вақт ўтказиш учун ичишганини тушунтириди. Назорат гурухида 48% аввалгидан кўра кўпроқ вақтлари бўлгани учун, 30% зерикиш, 21% пандемиядан хавотирга тушганлиги.

Карантин пайтида уйда ишлайдиган шахслар спиртли ичимликларни истеъмол қилишни кўпайишига сабаб бўлди деб ҳисобловчилар, асосий гурухда 80% ва назорат гурухида 60% ни ташкил этди.

Пандемия даврида уйда 18 ёшгача бўлган фарзандларнинг бўлиши спиртли ичимликларни истеъмол қилишни кўпайишига иккала гурухда мос равишда 60% ва 50% кўпайганлиги аниқланди.

Хулоса. Пандемия даврида кузатилган ижтимоий-иқтисодий қийинчиликлар ва ўзгаришлар спиртли ичимликларни истеъмол қилиш даражасига сезиларли таъсир кўрсатди. Алкоголизм билан касалланган беморларда спиртли ичимликларни истеъмол қилиш микдорининг ортишига асосий сабаб оиласда ўш болаларнинг мавжудлиги, уйда қолишига мажбурилилк ва уйда ишлаш, даромат манбанини йўқотиши. Эпизотик спиртли ичимликларни истеъмол қилувчиларда иш тартибининг ўзгариши, хавотир, яни уйда ишлаш ва зерикиш асосий сабаби сифатида аниқланди.

Адабиётлар:

1. Galea S., Merchant R. M., Lurie N. The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: the need for prevention and early intervention //JAMA internal medicine. – 2020. – Т. 180. – №. 6. – С. 817-818.
2. Schmits, Emilie, and Fabienne Glowacz. "Changes in alcohol use during the COVID-19 pandemic: impact of the lockdown conditions and mental health

factors." International journal of mental health and addiction (2021): 1-12.

3. Очилов У. У., Тураев Б. Т. и др. Клинические особенности психопатического поведения у подростков с психическими расстройствами //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 23-3 (101). – С. 71-74.
4. Очилов У. У., Тураев Б. Т., Хушвактова Д. Х. Распространенность когнитивных нарушений у пациентов с алкоголизмом //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 17-2 (95). – С. 104-106.
5. Ризаев Ж.А., Ризаев Э.А., Кубаев А.С. Роль иммунной системы ротовой полости при инфицировании пациентов коронавирусом SARSCOV-2 // Здоровье, демография, экология финноугорских народов. – 2020. – №. 3. – С. 67-69.
6. Ризаев Ж.А., Ахророва М. Особенности поражения полости рта при инфекции Sars-Cov-2 // Stomatologiya, 2021, стр. 59-63.
7. Тураев Б. Т. и др. Диагностика и лечение коморбидности алкоголизма и депрессивных расстройств //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 4-2 (107). – С. 26-30.
8. Тураев Б. Т., Хаятов Р. Б. Особенности электроэнцефалографических показателей у больных алкогольной зависимостью //Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных условиях. – 2019. – С. 150-151.
9. Тураев Б. Т., Хаятов Р. Б. Приморбидные особенности личности и суицидальное поведение больных алкоголизмом позднего возраста //Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных условиях. – 2019. – С. 151-153.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЧАСТОТУ И КОЛИЧЕСТВО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

Тураев Б.Т., Очилов У.У., Абдуразакова Р.Ш.,
Тураев Т.М.

Резюме. Имеются предварительные данные о влиянии пандемии COVID-19 на тревожность, депрессию, нарушения сна, потребление алкоголя и психическое здоровье. В условиях пандемии потребление алкоголя может быть использовано для преодоления трудностей, вызванных сопутствующими аномальными состояниями. Коморбидность между употреблением алкоголя и настроением или тревогой объясняется самолечением. Цель исследования: изучить влияние пандемии COVID-19 на потребление алкоголя. Метод исследования. Частота и количество употребления алкоголя оценивались с помощью теста на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя (AUDIT). Заключение: основной причиной увеличения потребления алкоголя больными алкоголизмом является наличие в семье малолетних детей, необходимость сидеть дома и работать на дому, потеря дохода.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, тревога, депрессия, алкоголизм.