

**COVID-19 ПАНДЕМИСИ ДАВРИДА АЛКОГОЛИЗМ БИЛАН КАСЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА
АЛКОГОЛЛИ МАХСУЛОТЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШДАГИ ЎЗГАРИШЛАР**



Тураев Бобир Темирпулотович

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

**ИЗМЕНЕНИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ БОЛЬНЫМИ АЛКОГОЛИЗМОМ ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ COVID-19**

Тураев Бобир Темирпулотович

Самаркандинский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

**CHANGES IN THE INTAKE OF ALCOHOL IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM DURING THE
COVID-19 PANDEMIC**

Turaev Bobir Temirpulotovich

Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: bobir.turaev.89@mail.ru

Резюме. Спиртли ичимликлар соглиқ учун зарапли эканлиги маълум, COVID-19 пандемияси даврида карантин қилинган пайтларда спиртли ичимликларни истеъмол қилиши саломатликнинг заифлашуви, руҳий саломатлик муаммоларини кучайтириши мумкин. Кўрқув ва нотўғри маълумотлар сабабли алкогол маҳсулотларини истеъмол қилиши COVID-19 вирусини ўлдириши мумкинлиги ҳақидаги нотўғри маълумотларни келтириб чиқарди. Ҳар қандай спиртли ичимликларни истеъмол қилиши соглиқ учун хавф түгдиради, лекин юқори қучли этил спиртини (этанол) истеъмол қилиши, айниқса, агар у метанол билан сохталашибилган бўлса, соглиқ учун жисидий оқибатларга, жумладан ўлимга олиб келиши мумкин. COVID-19 пандемиси алкоголизм билан каслланган беморларда алкоголли маҳсулотларни қабул қилиши миқдорига катта таъсир кўрсатган. Бунинг асосий сабаби сифатида беморларнинг оиласи ҳолати, 18 ёшгача бололарнинг мавжудлиги, иш билан ва молиявий муаммолар эканлиги аниқланди.

Калим сўзлар: COVID-19 пандемияси, алкоголизм, ижтимоий омиллар.

Abstract. It is known that alcohol is harmful to health, while consuming alcohol during quarantine periods during the COVID-19 pandemic can lead to poor health, exacerbating mental health problems. Fear and misinformation have led to misinformation that consuming alcohol can kill the COVID-19 virus. Consumption of any alcohol is a health risk, but consumption of high-strength ethyl alcohol (ethanol) can have serious health consequences, including death, especially if it is counterfeited with methanol. Pandemic COVID-19 okazala sushchestvennoe vliyanie na kolichestvo potrebyaemogo alkogolya bolnymi alkogolizmom. Ustanovлено, chto osnovnymi prichinami etogo yavlyayutsya semeynoe polojenie bolnyx, nalichie detey do 18 let, trudoustroystvo i materialnye problemy.

Keywords: pandemic COVID-19, alcoholism, social factor.

Долзарблиги. COVID-19 пандемияси даврида уй шароитида қолиш аҳоли ўртасида руҳий саломатлик ва психоактив моддаларни истеъмол қилиш хатти-харакатларига катта таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақида кўплаб фаразлар мавжуд. COVID-19 пандемияси даврида спиртли ичимликларни истеъмол қилиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида, карантин даврида истеъмолда ўзгаришлар юз берган [2]. Табий оғатлар кўпинча депрессия, хавотир ва психоактив моддаларни истеъмол қилиш каби руҳий ва хатти-харакатларнинг бузилишига олиб

келади [5, 6, 9]. Кўплаб адабиётларда стресс спиртли ичимликларни истеъмол қилиш хавфини ошири ҳақида маълумотлар келтирилган [3, 7, 8].

Кейинги вақтлардаги маълумотларга кўра карантин даврида спиртли ичимликларни истеъмол қилишни назорат қилиш мухим [1, 4, 10].

COVID-19 пандемияси билан боғлиқ кенг кўламли шароитлар ёки руҳий саломатлик заифликлари спиртли ичимликларни истеъмол қилишдаги ўзгаришларга таъсир қилиши мумкин, айниқса пандемия билан боғлиқ бўлган

шароитлар туфайли юзага келган қийинчилекларни енгисх учун спиртли ичимликларни истеъмол қилишлари мумкин. Спиртли ичимликларни истеъмол қилиш билан хавотир ўртасидаги коморбидлик тез-тез учраб туради [11].

Тадқиқот мақсади: Covid-19 пандемиси даврида алкоголизм билан каслланган беморларга алкоголь махсулотлари сущистеъмол қилишга ижтимоий омилларнинг таъсирини ўрганиши.

Тадқиқот материалари ва усуллари.

Тадқиқот 2020-2022 йиллар давомида Самарканд вилоят наркология шифохонаси ва диспансери базасида олиб борилди. Тадқиқот учун алкоголизмнинг II ва III босқичлари билан рўҳатда турувчи 100 нафар 25 ёшдан 45 ёшгача (ўртача ёши $37\pm3,6$) бўлган иштироклар танлаб олинди ва улар икки гуруҳга яни асосий гуруҳ алкоголизм II босқич билан каслланган беморлар (70 нафар) ва назорат гурухи алкоголизм III босқич билан каслланган беморларга (30 нафар) бўлиб ўрганилди. Тадқиқот учун биз анамнестик маълумотлар (кунлик алкоголь қабул қилиш миқдори ва кулик частотаси) фойдаланган ҳалда ижтимоий омиллар (оилавий ҳолати, ёш бололарнинг мавжудлиги ва иш билан боғлиқ муаммолар) таъсирини ўргандик.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот учун танлаб олинганларнинг оилавий ҳолати текширилганда, асосий гуруҳдагиларнинг 49 нафари (70%) оиласи, 21 нафари (30%) ажрашган ва ҳозирда ёлгиз. Назорат гуруҳдагиларнинг 18 нафари (60%) оиласи, 12 нафари (40%) ажрашган ва ҳозирда ёлгиз яшамоқда. Асосий гуруҳда оиласи беморларнинг 40 нафарида 18 ёшгача бўлган фарзандлар мавжуд. Назорат гурухида эса ушбу кўрсатгич 16 нафарни кўрсатмоқда. Мехнат билан бадлик кўрсатгичи аникланганда асосий гуруҳ беморларнинг 28 нафари (40%) доимий иш ўрнига эга ва пандемия даврида доимий даромат манбайнин йўқотмаган ва ушбу гуруҳ текширилувчиларнинг 42 нафари (60%) мавсумий иш билан банд ва улар Covid-19 пандемиси даврида даромат манбайнин йўқотган. Назорат гурухи беморларининг 9 нафари (30%) доимий иш ўрнига эга ва пандемия даврида доимий даромат манбайнин йўқотмаган. 12 нафари (40%) мавсумий иш билан банд ва улар Covid-19 пандемиси даврида даромат манбайнин йўқотган ва 9 (30%) нафарининг пандемиядан олдин ҳам даромат манбайи бўлмаган.

Асосий гуруҳдаги беморларнинг Covid-19 пандемисидан олдинги даврда кунлик алкоголь қабул қилиш миқдори ўртача 350 ± 70 млниташикли этди. Пандемия даврида эса ушбу кўрсатгич 480 ± 80 млга етди. Алкогол қабул қилишнинг миқдорий ортиши, биринчи ўринда ёлгиз яшовчи

ва доимий даромат манбайнига эга бўлмаганларда кузатилди. Ушбу гурух беморларда кун давомида ортиқча вақтнинг бўлиши алкоголь махсулотлари қабул қилиш частотасини ҳам кўпайтириди. Кейинги ўринда 18 ёшгача болаларнинг мавжудлиги ва доимий даромат манбайнига эга бўлмаганлик эканлиги аниқланди. Мактаб ва мактабгача таълим муассасаларининг пандемия сабабли ёпилиши ушбу беморларда оилавий дезадабтация ривожлантириди ва бундан қочиш учун улар янада кўпроқ алкоголь махсулотлари қабул қилишди. Оиласи, болалари 18 ёшдан катта ва доимий даромат манбайнига эга бўлган беморларда алкоголь махсулотлари қабул қилиш миқдор ва сифат кўрсатгичлари деярли ўзгармади.

Назорат гурухида пандемиядан олдинги ва пандемия давридаги кунлик алкоголь қабул қилиш миқдори таққосланганда (пандемиядан олдин 180 ± 80 ва пандемия даврида 190 ± 60) деярли ўзгаришлар кузатилмаганлиги аниқланди. Бунга сабаб бир томондан организм толератлиги ушбу босқичда пасайиши ва уларга атроф муҳиддаги ижтимоий омиллар тасирига жавоб реаксиянинг бўлмаслигидир.

Хулоса: Хулоса сифатида шуни айтиш мумкин: COVID-19 пандемиси алкоголизм II босқичи билан каслланган беморларда алкоголь махсулотларни қабул қилиш миқдорига катта таъсир кўрсатган. Бунинг асосий сабаби сифатида беморларнинг оилавий ҳолати, 18 ёшгача болаларнинг мавжудлиги, иш билан ва молиявий муаммолар эканлиги аниқланди. Алкоголизм III босқич билан каслланган беморларга COVID-19 пандемияси алкоголь қабул қилиш миқдорига деярли таъсир кўрсатмади.

Адабиётлар:

1. Schmits, Emilie, and Fabienne Glowacz. "Changes in alcohol use during the COVID-19 pandemic: impact of the lockdown conditions and mental health factors." International journal of mental health and addiction (2021): 1-12.
2. Turaev B.T., Ochilov U.U et al. Covid-19 pandemiyasi vaqtida spirtli ichimliklarni iste'mol qiluvchi shaxslarda depressiv buzilishlarning tarqalishi// Journal of biomedicine and pracnice. – 2022. – Т. 7. – №. 1. – С. 154-159.
3. Очилов У. У., Тураев Б. Т., Жумагелдиев Н. Н. Особенности формирования и течения алкоголизма у лиц с акцентуациями характера и личностными расстройствами //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 10-4 (88). – С. 101-103.
4. Очилов У. У., Тураев Б. Т., Хушвактова Д. Х. Распространенность когнитивных нарушений у пациентов с алкоголизмом //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 17-2 (95). – С. 104-106.
5. Тураев Б. Т. и др. Диагностика и лечение коморбидности алкоголизма и депрессивных

- расстройств //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 4-2 (107). – С. 26-30.
6. Тураев Б. Т., Очилов У. У., Хаятов Р. Б. Клинические особенности преморбидного течения депрессивных расстройств и алкогольной зависимости // Эндогенные психические расстройства. – 2020. – С. 64-68.
7. Тураев Б. Т., Хаятов Р. Б. Особенности электроэнцефалографических показателей у больных алкогольной зависимостью //Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных условиях. – 2019. – С. 150-151.
8. Тураев Б. Т., Хаятов Р. Б. Преморбидные особенности личности и суицидальное поведение больных алкоголизмом позднего возраста //Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных условиях. – 2019. – С. 151-153.
9. Тураев Б. Т., Хаятов Р. Б. Различия в поведенческих нарушениях и злоупотреблении спиртными напитками в катамнестическом исследовании лиц с расстройствами зрелой личности //Антология российской психотерапии и психологии. – 2019. – С. 171-171.
10. Тургунбоев А. У., Кубаев Р. М. Оптимизация лечения субдепрессивных состояний у алкоголиков с абстинентным синдромом за счет правильного назначения антидепрессивной терапии //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 24-2 (102).
11. Хаятов Р. Б. и др. Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 11 (52). – С. 96-98.

ИЗМЕНЕНИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ БОЛЬНЫМИ АЛКОГОЛИЗМОМ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Тураев Б.Т.

Резюме. Известно, что алкоголь вреден для здоровья, а употребление алкоголя в период карантина во время пандемии COVID-19 может привести к ухудшению здоровья, усугубив проблемы с психическим здоровьем. Страх и дезинформация привели к дезинформации о том, что употребление алкоголя может убить вирус COVID-19. Употребление любого алкоголя представляет риск для здоровья, но употребление крепкого этилового спирта (этанола) может иметь серьезные последствия для здоровья, вплоть до летального исхода, особенно если его подделывают метанолом. Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на количество потребляемого алкоголя больными алкоголизмом. Установлено, что основными причинами этого являются семейное положение больных, наличие детей до 18 лет, трудоустройство и материальные проблемы.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, алкоголизм, социальный фактор.